

Οξείες λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού συστήματος

Οι οξείες λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού συστήματος περιλαμβάνουν την πνευμονία (λοίμωξη της κυψελίδας του πνεύμονα), καθώς επίσης και λοιμώξεις που επηρεάζουν τους αεραγωγούς, όπως η οξεία βρογχίτιδα και η βρογχιολίτιδα, η γρίπη και ο κοκκύτης. Αποτελούν κύρια αιτία ασθενειών και θανάτων σε παιδιά και ενήλικες ανά τον κόσμο. Η σοβαρότητα των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος ενδέχεται να υποτιμηθεί.



ELF EUROPEAN LUNG FOUNDATION



ERS EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY

Τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες

- Η ορθή χρήση αντιβιοτικών είναι ζωτικής σημασίας για να πάψουν οι περιπτώσεις λοιμώξεων που είναι ανθεκτικές στη χρήση αντιβιοτικών.
- Υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη νέων ή πιο αποτελεσματικών εμβολίων κατά των πνευμονικών λοιμώξεων και ιών, και απαιτεί συνεργασία ανάμεσα στα κράτη.
- Πρέπει να σχεδιαστούν νέες θεραπευτικές στρατηγικές ενάντια στα ανθεκτικά βακτήρια.



Η βρογχιολίτιδα είναι η πιο κοινή αιτία εισαγωγής σε νοσοκομείο τους πρώτους 12 μήνες ζωής.




Οι ιοί της γρίπης προσβάλλουν έως και 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, κάθε χρόνο.




Περισσότερο από το 90% των θανάτων που σχετίζονται με γρίπη συμβαίνουν σε ηλικιωμένους ασθενείς.



Στην Ευρώπη, σημειώνονται περίπου 16.500.000 κρούσματα οξείας βρογχίτιδας κάθε χρόνο.



Στα παιδιά, οι οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις ευθύνονται για σχεδόν 50% των επισκέψεων σε γιατρούς και των νοσηλείων.



Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αναμένονται κάθε χρόνο περίπου 3.370.000 κρούσματα πνευμονίας.