

32 Παράγοντες κινδύνου κατά τα πρώτα χρόνια ζωής

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορεί να συμβούν νωρίς στη ζωή ενός ανθρώπου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναπνευστικά προβλήματα στη μετέπειτα ζωή. Αυτοί περιλαμβάνουν απουσία μητρικού θηλασμού, αύξηση σωματικού βάρους, χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της κύησης από τη μητέρα, επιπλοκές κατά τον τοκετό και κακή ποιότητα αέρα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.



Τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες


- Οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους του καπνίσματος κατά την κύηση.
- Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη προς νέους γονείς σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στα μωρά.
- Καθώς το ποσοστό επιβίωσης πρόωρων βρεφών αυξάνεται, το ίδιο συμβαίνει και με τη συχνότητα βρεφών που απαιτούν θεραπεία. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της φροντίδας των πρόωρων βρεφών.



Έρευνα έχει δείξει ότι σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών, ο κίνδυνος πνευμονοπάθειας αυξάνεται κατά 72% εάν η μητέρα καπνίζει.




Κάπου 30-50% των παιδιών που εμφανίζουν συριγμό ως αποτέλεσμα της λοίμωξης που συνέβη κατά τη βρεφική ηλικία θα αναπτύξουν άσθμα.




Το κάπνισμα των γονέων μπορεί να ευθύνεται για το 20% όλων των περιπτώσεων άσθματος σε παιδική ηλικία.



Το 20% των βρεφών των οποίων οι μητέρες κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της κύησης νοσηλεύεται για Βρογχίτιδα τα 5 πρώτα χρόνια της ζωής τους, σε σύγκριση με το 15% των βρεφών των οποίων οι μητέρες δεν κάπνιζαν.



Η μη φυσιολογική ανάπτυξη των πνευμόνων σχετίζεται με το 15-20% των θανάτων σε νεογέννητα μωρά.



Η πνευμονική υγεία παππούδων - είτε καπνίζουν είτε όχι - έχει γενετικό αντίκτυπο στην υγεία των πνευμόνων των εγγονιών τους.