


Διαχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες

Οι διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες, επίσης γνωστές ως διάχυτες παρεγχυματικές πνευμονοπάθειες, είναι αποτέλεσμα βλάβης στα κύτταρα που περιβάλλουν τους αεροχώρους, που οδηγεί σε εκτεταμένη φλεγμονή και πνευμονική ίνωση.



Τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες

- Οι διάμεσες πνευμονοπάθειες αποτελούν αυξανόμενη επιβάρυνση για τους πόρους υγειονομικής περίθαλψης - απαιτείται καλύτερη διάθεση των εξειδικευμένων υπηρεσιών ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενειών.
- Απαιτούνται μεγάλης κλίμακας έρευνες σχετικά με τα γενετικά αίτια των διάμεσων πνευμονοπαθειών ώστε να βελτιωθεί η πρόληψη και η θεραπεία.




Υπάρχουν περισσότερες από 300 διαφορετικές ασθένειες οι οποίες ταξινομούνται ως διάμεσες πνευμονοπάθειες.




Η συχνότητα νοσηλείας για διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες είναι υψηλότερη σε Αυστρία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Πολωνία και Σλοβακία με περισσότερα από 40 άτομα ανά 100.000.




Το υψηλότερο ποσοστό θανάτου για διάμεσες πνευμονοπάθειες, μεγαλύτερο από 2,5 τοις εκατό ανά 100.000, παρατηρείται σε ΗΒ, Ιρλανδία, Σκανδιναβία, Κάτω Χώρες και Ισπανία.



Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν αναγνωριστεί στο 35% των ατόμων με διάμεση πνευμονοπάθεια.



Κάποιες μελέτες αναφέρουν πως όταν αθροίζονται περιπτώσεις ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης και σαρκοειδωσης, ανέρχονται στο 50% του συνόλου των διάμεσων πνευμονοπαθειών.



Η σαρκοειδωση είναι πιο διαδεδομένη σε νεαρούς ενήλικες και των δύο φύλων και σε γυναίκες άνω των 50 ετών.