


Επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου

Οι επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις βλαβερές συνέπειες της αναπνοής που προκαλούνται από διάφορα σωματίδια, αέρια, αναθυμιάσεις ή καπνό στο χώρο εργασίας. Οι διαφορετικοί αυτοί παράγοντες συχνά αναφέρονται ως "ουσίες".




Τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες


- Τα όρια στο χώρο εργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ποια επίπεδα ουσιών μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, πέραν των επαγγελματικών παθήσεων.
- Οι γιατροί πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στη λήψη επαρκούς ιστορικού έκθεσης.
- Καθώς εντοπίζονται νέες ουσίες, θα πρέπει να ρυθμίζονται γρήγορα.




Η έκθεση σε σωματίδια, αέρια, αναθυμιάσεις ή καπνό στο χώρο εργασίας είναι υπεύθυνη για το 15% όλων των καρκίνων του αναπνευστικού συστήματος σε άνδρες και το 5% σε γυναίκες.




Το 15-20% όλων των κρουσμάτων άσθματος ενηλίκων σχετίζονται με την εργασία.




Μεταξύ 350 και 400 διαφορετικές ουσίες είναι γνωστό ότι προκαλούν επαγγελματικό άσθμα.



Το 15-20% της ΧΑΠ θεωρείται ότι σχετίζεται με την επαγγελματική έκθεση.



Αν και η χρήση αμιάντου είναι πλέον παράνομη, οι άνθρωποι που είχαν εκτεθεί σε νεαρή ηλικία ζουν με μεσοθελίωμα σε μεγάλη ηλικία, καθώς τα συμπτώματα της νόσου μπορεί να χρειαστούν έως και 50 χρόνια για να εμφανιστούν.



Η έκθεση σε σωματίδια, αέρια, αναθυμιάσεις ή καπνό στο χώρο εργασίας είναι υπεύθυνη για το 10% όλων των κρουσμάτων διάμεσης πνευμονοπάθειας.