

Tubercolosi (TBC)

La tubercolosi (TBC) è una patologia causata dal batterio *Mycobacterium tuberculosis*. Sebbene il numero di casi di TBC sia diminuito negli ultimi decenni, specialmente nei Paesi industrializzati, tale patologia rappresenta ancora un problema di sanità pubblica di prima linea, particolarmente nei Paesi a reddito medio e basso. Il regime terapeutico per le forme multiresistenti ed estensivamente resistenti ai farmaci è sensibilmente più lungo e dispendioso rispetto a quello per la forma più comune della malattia.



ELF EUROPEAN LUNG FOUNDATION



ERS EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY

Aree di azione

- Sono stati compiuti molti passi avanti nell'ambito dei metodi diagnostici, benché persistano ostacoli logistici e finanziari alla loro adozione su larga scala.
- Spetta ai Paesi che presentano un alto tasso di TBC adottare e portare avanti accurati metodi diagnostici, insieme a strategie volte alla gestione dell'elevato numero di pazienti affetti da TBC non resistente e multiresistente ai farmaci.
- È necessario fare ulteriori progressi nell'ambito di vaccini e farmaci, al fine di controllare la patologia sia a livello europeo che a scala globale.
- Sono necessari ulteriori studi al fine di identificare i marcatori della patologia, al fine di predire il successo di eventuali nuove terapie e vaccini.
- Urge una maggiore cooperazione tra stati nell'ambito della gestione del trattamento della patologia per gli immigrati.

HIV+


L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che nel 2011 si sono verificati 8,7 milioni di nuovi casi di TBC, dei quali 1,0/1,2 milioni presentavano infezione da HIV.



Il numero totale di decessi per TBC nel 2011 è stato stimato a 1,4 milioni in tutto il mondo.



Ogni anno, in Europa, sono diagnosticati quasi 400.000 nuovi casi di TBC, mentre più di 40.000 persone perdono la vita a causa della malattia.



La maggior parte dei pazienti che non sono sottoposti a cura per TBC polmonare muoiono entro un anno e mezzo dalle prime manifestazioni sintomatiche.



La situazione è particolarmente problematica nei Paesi dell'ex Unione Sovietica, nei quali la tubercolosi multiresistente ai farmaci è estremamente prevalente.



La terapia volta alla cura della TBC è complessa e della durata di diversi mesi, e implica la somministrazione di almeno 4 farmaci.