

# Astma wieku dziecięcego

Astma to stan, który powoduje zapalenie dróg oddechowych. Jest to najczęściej występująca długotrwała choroba u dzieci. Astma może wystąpić w każdym momencie życia, ale wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszych objawów w dzieciństwie.



## Bieżące i przyszłe potrzeby


- W szkołach należy wprowadzić środki ostrożności zmierzające do redukcji ekspozycji w przypadku dzieci z alergiczną astmą.
- Należy położyć nacisk na opanowanie astmy wysiłkowej na zajęciach wychowania fizycznego w szkole.
- Potrzebne są dalsze badania naukowe dotyczące środowiskowych i genetycznych przyczyn astmy wieku dziecięcego.




Przewiduje się wzrost chorobowości astmy w Europie Wschodniej.




13% opiekunów dzieci z astmą w Wielkiej Brytanii potwierdziło konieczność rezygnacji z pracy, aby móc opiekować się dzieckiem.




Astma rozpoczyna się zwykle na znacznie wcześniejszym etapie życia niż inne choroby przewlekłe, co sprawia, że staje się obciążeniem na całe życie dla pacjentów, ich opiekunów i społeczeństwa.



Okolo jedna trzecia populacji będzie miała astmę na pewnym etapie życia w wieku od 5 do 80 lat, przy czym większość – przed ukończeniem 20. rż.



Opracowanie bardziej skutecznych leków może zredukować potrzebę hospitalizacji z powodu astmy.



65% wszystkich ataków astmy u dzieci w wieku szkolnym spowodowanych jest infekcją wywołaną przez rinowirusy.